


Antibiothérapie suppressive / palliative

6 mars 2017


Guillaume Gras

Maladies Infectieuses - CHU Tours

- Femme de 72 ans
- AVC hémorragiques X2
- Se déplace en fauteuil roulant, fait ses transferts seule
- Adressée en consultation par MT pour douleurs hanche gauche
- Fistule productive depuis plusieurs mois



n-2013 16:28
9003674
99



120 mm

G

W:1023 L:512

- A l'examen
 - Fistule en tête d'épingle
 - Mobilité quasi normale peu douloureuse
- Indication chirurgicale non retenue
- Antibiothérapie?
 - Si oui, est elle palliative? Suppressive?

DEFINITIONS

- suppressif
 - *action de supprimer; résultat de cette action*
 - *fait de faire cesser d'être, de mettre fin à l'existence de*
- palliatif
 - *Se dit d'un traitement qui n'agit pas directement sur la maladie (en particulier un traitement symptomatique), ou qui la soulage sans pouvoir la guérir*

- Traitement optimal des infections ostéo-articulaires
= médico-chirurgical
- Dans des situations non exceptionnelles, la prise en charge chirurgicale n'est pas retenue

RECOMMENDATIONS

OSTEOMYELITIS CHRONIQUE

- Pas de recommandations
- Pas de données sur antibiothérapie au long cours en cas d'abstention chirurgicale

Lew DP, Lancet 2004; 364 : 369-379

Recommandations de pratique clinique

Infections ostéo-articulaires sur matériel

(prothèse, implant, ostéo-synthèse)



3.3.2.2.6 Antibiothérapie suppressive

Elle consiste à maintenir une antibiothérapie orale dans la grande majorité des cas pour une durée indéterminée dans le but d'inhiber la multiplication bactérienne autour de la prothèse.

Elle ne s'applique qu'aux situations pour lesquelles la documentation bactérienne est connue et pour lesquelles l'infection persiste chez un malade inopérable ayant une prothèse non descellée. Elle ne se conçoit qu'avec des molécules bien supportées, d'administration aisée (voie orale) et pour lesquelles une monothérapie est possible [131, 242-244] (**grade C**).

Diagnosis and Management of Prosthetic Joint Infection: Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America^a

- Antibiothérapie suppressive parfois préconisée comme une alternative à la prise en charge chirurgicale
- Objectif de l'antibiothérapie au long cours => éviter rechutes
- Indications : refus du patient ou « unsuitable » pour résection, changement ou amputation
- Désaccord des experts
 - tous les patients?
 - Seulement patients âgés ou immunodéprimés?
 - Seulement patients pour qui une nouvelle chirurgie n'est pas envisageable?

Diagnosis and Management of Prosthetic Joint Infection: Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America^a

IDSA GUIDELINES

- Éléments à prendre en compte
 - risque de perte du stock osseux
 - risque toxicité AB long cours
- Pas de linézolide ou de rifampicine

Diagnosis and Management of Prosthetic Joint Infection: Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America^a

IDSA GUIDELINES

Table 3. Common Antimicrobials Used for Chronic Oral Antimicrobial Suppression (B-III Unless Otherwise Stated in Text)^{a,b}

Microorganism	Preferred Treatment	Alternative Treatment
Staphylococci, oxacillin-susceptible	Cephalexin 500 mg PO tid or qid or Cefadroxil 500 mg PO bid	Dicloxacillin 500 mg PO tid or qid Clindamycin 300 mg PO qid Amoxicillin-clavulanate 500 mg PO tid
Staphylococci, oxacillin-resistant	Cotrimoxazole 1 DS tab PO bid Minocycline or doxycycline 100 mg PO bid	
β -hemolytic streptococci	Penicillin V 500 mg PO bid to qid or Amoxicillin 500 mg PO tid	Cephalexin 500 mg PO tid or qid
<i>Enterococcus</i> spp, penicillin susceptible	Penicillin V 500 mg PO bid to qid or Amoxicillin 500 mg PO tid	
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Ciprofloxacin 250–500 mg PO bid	
Enterobacteriaceae	Cotrimoxazole 1 DS tab PO bid	β -lactam oral therapy based on in vitro susceptibilities
<i>Propionibacterium</i> spp	Penicillin V 500 mg PO bid to qid or Amoxicillin 500 mg PO tid	Cephalexin 500 mg PO tid or qid Minocycline or doxycycline 100 mg PO bid

Diagnosis and Management of Prosthetic Joint Infection: Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America^a

IDSA GUIDELINES

- Questions en suspens
 - Quel est le rôle de l'antibiothérapie suppressive
 - Quand est elle indiquée?
 - Quelle durée?
 - Quelles molécules?

Management of Periprosthetic Joint Infection: The Current Knowledge



- Quand chirurgie = risque trop important
+ microorganisme peu virulent et sensible aux antibiotiques
⇒ une antibiothérapie suppressive pourrait être la meilleure stratégie thérapeutique malgré l'absence de données dans la littérature
- Autre indication : infection persistante après lavage pour qui une nouvelle prise en charge chirurgicale est refusée ou serait trop risquée

BASES RATIONNELLES
EFFICACITE / TOLERANCE

Prolonged Suppressive Antibiotic Therapy for Infected Orthopedic Prostheses

John Segreti, Jeffrey A. Nelson, and
Gordon M. Trenholme

From the Rush Medical College, Chicago, Illinois

- 18 patients, âge moyen 66 ans
- 9 sepsis précoces / 9 tardifs
- IPOA, lavage débridement
- Succès = patient asymptomatique
- Durée moyenne antibiothérapie = 48 mois (4-103)

Table 2. Oral antibiotics used as suppressive agents, duration of therapy, and outcome.

Patient no.	Suppressive antibiotic(s) (dosage)	Duration (mo) of therapy	Antibiotic therapy continued?	Outcome	Complications
1	Cephalexin (500 mg q.i.d.)	103	Yes	Success	None
2	Penicillin (500 mg po q.i.d.)	69	Yes	Success	None
3	Cefadroxil (500 mg po b.i.d.)	96	Yes	Success	None
4	Oxacillin (500 mg po q.i.d.)	51	Yes	Success	None
5	Minocycline/rifampin (100 mg b.i.d./600 mg q.d. po)	56	Yes	Success	None
6	Minocycline/rifampin (100 mg/600 mg po q.d.)	69	Yes	Success	Diarrhea
7	Ampicillin (500 mg po q.i.d.)	12	No	Success	None
8	Minocycline/rifampin (100 mg/600 mg po q.i.d.)	59	Yes	Success	None
9	Dicloxacillin (500 mg po q.i.d.)	22	No	Failure*	None
10	Amoxicillin/clavulanate (500 mg po t.i.d.)	103	Yes	Success	None
11	Minocycline/rifampin (100 mg/600 mg po q.d.)	16	No	Success	Diarrhea
12	Dicloxacillin (500 mg po q.i.d.)	28	No	Success	None
13	Penicillin (500 mg po q.i.d.)	49	Yes	Success	None
14	Minocycline/rifampin (100 mg/600 mg po q.d.)	50	Yes	Success	None
15	TMP-SMZ/rifampin (one DS po q.d./600 mg po q.d.)	71	Yes	Success	None
16	Clindamycin (300 mg po t.i.d.)	4	No	Failure	None
17	Dicloxacillin (500 mg po q.i.d.)	9	No	Failure	Diarrhea
18	Dicloxacillin (500 mg po q.i.d.)	13	No	Failure	Diarrhea, drug rash

Prolonged Suppressive Antibiotic Therapy for Infected Orthopedic Prostheses

John Segreti, Jeffrey A. Nelson, and
Gordon M. Trenholme

From the Rush Medical College, Chicago, Illinois

- Efficacité :
 - 7 patients ont stoppés
 - 3 échecs : à 8,7 mois
 - 4 à la demande du patient (3 sans rechutes à l'arrêt)
- Tolérance:
 - 4 diarrhées à *Clostridium* (22%) mais pas d'arrêt des AB
- Pas de notion de fistule

- Conclusion des auteurs : efficacité = $15/18 = 83\%$

MAIS

- Pas de détail sur délais lavage / symptômes

4 patients ont arrêté AB dont 3 sans rechutes

- Autres
 - Goulet et al : 63% (19 IPOA)

Goulet JA, Pellici PM, Brause BD, Salvati EM. Prolonged suppression of infection in total hip arthroplasty. J Arthroplasty 1988;3:109–16.

- Tsukayama et al : 23% (13 IPOA)

Tsukayama DT, Wicklund B, Gustilo RB. Suppressive antibiotic therapy in chronic prosthetic joint infections. Orthopedics 1991;14:841–4.

Conservative medical therapy of prosthetic joint infections: retrospective analysis of an 8-year experience

- Etude rétrospective
- 34 patients
- IPOA
 - 12 sepsis précoces
 - 9 non documentées
- Durée AB = 41 semaines (24-96)
- Efficacité = 91% (31/34)

Outcome of Prosthetic Joint Infections Treated with Debridement and Retention of Components

- 99 IPOA chez 91 patients
- Age moyen = 74 ans
- Durée médiane AB = 541 jours
- AB long cours : 52% échec (46/88)
- Pas d'AB au long cours : 63% échec (7/11)

Outcome of Prosthetic Joint Infections Treated with Debridement and Retention of Components

Table 5. Adverse effects of antimicrobial therapy for 99 episodes of prosthetic joint infection occurring in 91 patients, 1995–1999.

Side effect	No. (%) of episodes
Delayed hypersensitivity reaction	11 (11)
Nephrotoxicity (due to vancomycin)	1 (1)
Hepatotoxicity	0
Ototoxicity or vestibular toxicity	0
Diarrhea	3 (3)
Pseudomembranous colitis	1 (1)
Leukopenia (due to vancomycin)	1 (1)
Skin discoloration (due to minocycline)	1 (1)

One hundred and twelve infected arthroplasties treated
with 'DAIR' (debridement, antibiotics and implant retention):
antibiotic duration and outcome

I. Byren^{1,2*†}, P. Bejon^{1,2†}, B. L. Atkins¹⁻³, B. Angus², S. Masters¹, P. McLardy-Smith¹,
R. Gundle¹ and A. Berendt¹

- 112 patients
- âgés, nombreuses comorbidités
- IPOA + lavage
 - prothèses posées < 3 mois chez 69% des patients
- Durée AB = 1,5 ans
- 18% d' échecs seulement
- Facteurs associés à l'échec : staphylocoque doré, ATCDs révision, arthroscopie




Figure 3. Kaplan–Meier plot of time to treatment failure for patients on oral antibiotics (HR=1) and patients stopping oral antibiotics (where day of stopping is day 0, HR=4.3, 95% CI 1.4–12.8, $P=0.01$).

- Conclusion : Allonger la durée de l'antibiothérapie ne prévient pas la rechute mais la repousse

- Efficacité difficilement interprétable
 - Séries limitées
 - Patients hétérogènes
 - Ne relevant pas forcément tjs d'une AB long cours
- Tolérance variable : 10 à 25% d'effets indésirables



JNI

14^{es} Journées
Nationales
d'Infectiologie

Clermont-Ferrand
et l'interrégion Rhône-Alpes Auvergne

Du mercredi 12 au
vendredi 14 juin 2013
Polydome, centre d'expositions
et des congrès



Faut-il une antibiothérapie suppressive dans les infections ostéo-articulaires en abstention chirurgicale?

Guillaume Gras, Nathalie Asseray, Hélène Chaussade,
Philippe Rosset, David Bouteille, Sophie Touchais, Louis Bernard




METHODES


- Etude bicentrique rétrospective
- Evolution défavorable =
 - Episode septique systémique
 - Autre localisation infectieuse
 - Décès
 - Dégradation majeure de l'autonomie

RESULTATS

- 59 patients analysés
 - Âge moyen = 67,8 ans
 - Sex ratio H/F = 0,97
 - Comorbidités



- Microorganismes identifiés
 - *Staphylococcus aureus* 44%
 - Staphylocoque coagulase negative 10%
 - Entérobactéries 7%
 - Streptocoques 10%
 - Polymicrobiens 17%
 - Autres 12%
- Fistule
 - Fistule spontanée lors de la prise en charge = 73% (43/59)



Caractéristiques des infections. N=59

- Antibiothérapie suppressive : 20 patients (34%)
 - Durée moyenne = 25,2 mois
 - Bithérapie pour 6 patients
 - Monothérapie 14 patients
 - doxycycline (3)
 - pristinamycine (3)
 - cotrimoxazole (3)
 - pénicillines (4)


- Evolution

- Suivi moyen = 23,5 mois
- défavorable dans 41% des cas (24/59)
- groupe antibiothérapie : 40% versus 41%,
p=0,9

• Analyse multivariée	aOR	IC95%	p
Néoplasie	1,74	[1,02-31,78]	p=0,04
Infection prothétique	2,06	[1,24-50,13]	p=0,03
Absence initiale de fistule	1,63	[1,21-21,55]	p=0,03
Antibiothérapie suppressive	0,80	[0,10-1,95]	p=0,29

Outcome of patients over 80 years of age on prolonged suppressive antibiotic therapy for at least 6 months for prosthetic joint infection

Virginie Prendki^{a,b,c,*}, Valérie Zeller^{b,c,d}, Dorick Passeron^{c,d}, Nicole Desplaces^{c,e}, Patrick Mamoudy^{c,d}, Jérôme Stirnemann^a, Simon Marmor^{c,d}, Jean-Marc Ziza^{b,c}



Conclusions: Prolonged suppressive antibiotic therapy is an alternative therapy in elderly patients with PJI when surgery is contraindicated and when the bacteria are susceptible to well-tolerated oral antimicrobial therapy such as beta-lactams.

Figure 1. Clinical outcome of 38 patients with prosthetic joint infections treated with prolonged suppressive antibiotic therapy. Kaplan-Meier curve showing survival without event (95% confidence interval in grey). Events are defined as failure and unrelated death.

Définition de l'échec?

- Quelle définition dans les abstentions chirurgicales? Une fistule est elle un échec?
- « Certains patients guéris vont moins bien que des patients en échec »

⇒ Importance de redéfinir l'échec dans cette population

AU TOTAL

- Antibiothérapie palliative
 - ⇒ Pas de bases scientifiques
 - ⇒ Pas d'indication
- Antibiothérapie suppressive
 - Efficacité non définie
 - Reculer pour mieux sauter?
 - Effets indésirables autour de 20%

- Intérêt de mesurer l'impact de cette antibiothérapie
 - Critères fonctionnels
 - Evènements infectieux systémiques
- Si une antibiothérapie suppressive doit être envisagée
 - Monothérapie, bien tolérée
 - Absence de fistule
 - IPOA