

CENTRES DE RÉFÉRENCE
POUR LES INFECTIONS OSTÉO-ARTICULAIRES COMPLEXES
DU GRAND OUEST

CRIOGO



CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE DE NANTES

FICHES PATIENT ANTIBIOTIQUES

Journée annuelle du CRIOGO

13/01/2023

Barbara TROUSSIER

Pharmacien clinicien – Chirurgie orthopédique et traumatologique

CHU de Nantes

Contexte

**EQUIPE MOBILE DE PHARMACIE CLINIQUE
DU CHU DE NANTES (HD et HGRL)**

5 Pharmaciens Assistants Spécialistes

2 internes en pharmacie

9 à 10 étudiants AHU

En unité de CHIRURGIE

Contexte

Avant la RCP


- Activité de conciliation médicamenteuse
- Obtention du traitement chronique
- Allergies/ intolérances ?
- Prise d'ATB récente
- Préparation du staff IOA



Pendant la RCP

- Présentation du patient
- Présentation des résultats bactériologiques
- Choix de l'ATB
- Interactions médicamenteuses

Après la RCP



Après la RCP

- Préparation de/des fiche(s) antibiotique(s) remise(s) au patient

CONTACT

Pour toute question relative à ce médicament, vous pouvez contacter un pharmacien du CHU.

Par téléphone au 02 40 08 41 54 (secrétariat de la pharmacie, demander à parler au pharmacien de chirurgie).

Horaires d'ouverture : 9h - 17h

Ou par mail :
bp-equipe-mobile-pharmacie@chu-nantes.fr

AUTRES INFORMATIONS

DOCUMENT DESTINE AUX PATIENTS DE CHIRURGIE

RIFAMPICINE

RIMACTAN[®] 300MG
RIFADINE[®] 300MG
RIFADINE[®] 2% susp. buvable

Document remis le :

Par :

NOM DU PATIENT :

PRENOM :

DDN :



Equipe mobile de
pharmacie clinique
CHU NANTES
V2 01/2022



RIFAMPICINE

RIMACTAN[®] 300MG - RIFADINE[®] 300MG - RIFADINE[®] 2% susp buvable

Ce médicament est un **antibiotique**

Ne pas interrompre un traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis médical

QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI ?

- Si vous vous rendez compte de l'oubli dans les heures qui suivent l'heure de prise habituelle, prenez la dose et ne décalez pas l'heure de la prochaine prise.
- Si l'oubli est supérieur à heures, sautez la prise et prenez la suivante à l'heure habituelle.
(6h si 2 prises /j, 12h si 1 prise /j)
- **Ne doublez pas** la dose pour compenser l'oubli.

QUELS SONT LES PRECAUTIONS A PRENDRE VIS-A-VIS DES AUTRES MEDICAMENTS ?

PILULE CONTRACEPTIVE, CONTRACEPTION OESTROPROGESTATIVE (IMPLANTS, PATCHS, STERILETS HORMONAUX, ANNEAUX VAGINAUX) :
la rifampicine diminue l'efficacité de ces moyens de contraception : utiliser une autre méthode contraceptive (préservatifs +++) pendant le traitement et le mois suivant l'arrêt

ANTICOAGULANTS DE TYPE AVK (Coumadine[®], Previscan[®], Sintrom[®]) :
la rifampicine diminue l'efficacité de ce traitement. Des contrôles de l'INR (prise de sang) plus fréquents doivent être réalisés afin d'adapter la posologie.

VOTRE POSOLOGIE :

- comprimé(s) à mg
- fois par jour
1h avant ou 2h après le repas
 matin midi soir
- Date de fin :

INFORMATIONS PRATIQUES

- **CONSERVATION :**
- Conservez le médicament dans un endroit sec, à température ambiante (<25°C)
- Evitez les endroits humides tels que la salle de bain
- Conservez hors de la vue et de la portée des enfants
- **ALCOOL :**
- Il est **très fortement déconseillé** de consommer des boissons alcoolisées pendant votre traitement

QUELS SONT LES PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES ?

- **DIARRHEES :**
Effet normal qui disparaîtra à l'arrêt du traitement
 - **COLORATION BRUNE ORANGEE** de la salive, des larmes, des urines et des selles se produit systématiquement.
- Il est **déconseillé de porter des lentilles** de contact souples durant le traitement car elles seront tachées de façon permanente.

EFFET NORMAL
qui disparaîtra à l'arrêt du traitement
CONTINUEZ LE MEDICAMENT



- **DIARRHEES persistantes et importantes**
- **SAIGNEMENTS inexpliqués**
- **DEMANGEAISONS généralisées**
- **AUTRES**
Nausées, vomissements, fatigue, perte d'appétit

CONTACTEZ VOTRE MEDECIN.



CONTINUEZ LE MEDICAMENT


- **REACTIONS IMPORTANTES**
Rash, fièvre, cloques, rougeur des yeux, maux de gorge, douleurs musculaires et articulaires
- **REACTIONS ALLERGIQUES**
type œdème de Quincke

URGENT

CESEZ DE PRENDRE CE MEDICAMENT

CONTACTEZ VOTRE MEDECIN

Après la RCP



Moyenne : 12 patients/mois

Fiches antibiotiques

Acide fusidique

Amoxicilline

Amoxicilline/acide
clavulanique

Ciproflaxcine

Clindamycine

Cotrimoxazole

Délaflouxacine

Doxycycline

Lévofloxacin

Linézolide

Moxifloxacin

Rifampicine

Tédizolide

RIFAMPICINE

RIMACTAN[®] 300MG - RIFADINE[®] 300MG - RIFADINE[®] 2% susp buvable

Ce médicament est un **antibiotique**

Ne pas interrompre un traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis médical

QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI ?

- Si vous vous rendez compte de l'oubli dans les heures qui suivent l'heure de prise habituelle, prenez la dose et **ne décalez pas** l'heure de la prochaine prise.
- Si l'oubli est supérieur à heures, sautez la prise et prenez la suivante à l'heure habituelle.
(6h si 2 prises /j, 12h si 1 prise /j)
- **Ne doublez pas** la dose pour compenser l'oubli.

QUELS SONT LES PRECAUTIONS A PRENDRE VIS-A-VIS DES AUTRES MEDICAMENTS ?

PILULE CONTRACEPTIVE, CONTRACEPTION OESTROPROGESTATIVE (IMPLANTS, PATCHS, STERILETS HORMONAUX, ANNEAUX VAGINAUX) :

la rifampicine diminue l'efficacité de ces moyens de contraception : utiliser une autre méthode contraceptive (préservatifs +++) pendant le traitement et le mois suivant l'arrêt

ANTICOAGULANTS DE TYPE AVK (Coumadine[®], Previscan[®], Sintrom[®]) :

la rifampicine diminue l'efficacité de ce traitement. Des contrôles de l'INR (prise de sang) plus fréquents doivent être réalisés afin d'adapter la posologie.

VOTRE POSOLOGIE :

- comprimé(s) à mg
- fois par jour
1h avant ou 2h après le repas
 matin midi soir
- Date de fin :

INFORMATIONS PRATIQUES

- **CONSERVATION :**
 - Conservez le médicament dans un endroit sec, à température ambiante (<25°C)
 - Evitez les endroits humides tels que la salle de bain
 - Conservez hors de la vue et de la portée des enfants
- **ALCOOL :**
 - Il est **très fortement déconseillé** de consommer des boissons alcoolisées pendant votre traitement

QUELS SONT LES PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES ?

- **DIARRHEES :**
Effet normal qui disparaîtra à l'arrêt du traitement
- **COLORATION BRUNE ORANGEE** de la salive, des larmes, des urines et des selles se produit systématiquement.
Il est **déconseillé de porter des lentilles** de contact souples durant le traitement car elles seront tachées de façon permanente.

EFFET NORMAL qui disparaîtra à l'arrêt du traitement
CONTINUEZ LE MEDICAMENT



- **DIARRHEES** persistantes et importantes
- **SAIGNEMENTS inexpliqués**
- **DEMANGEAISONS** généralisées
- **AUTRES**
Nausées, vomissements, fatigue, perte d'appétit

CONTACTEZ VOTRE MEDECIN.



CONTINUEZ LE MEDICAMENT

- **REACTIONS IMPORTANTES**
Rash, fièvre, cloques, rougeur des yeux, maux généraux, douleurs musculaires et articulaires
- **REACTIONS ALLERGIQUES**
type œdème de Quincke

URGENT

CESSEZ DE PRENDRE CE MEDICAMENT

CONTACTEZ VOTRE MEDECIN

RIFAMPICINE

RIMACTAN[®] 300MG - RIFADINE[®] 300MG - RIFADINE[®] 2% susp buvable

Ce médicament est un **antibiotique**

Ne pas interrompre un traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis médical

QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI ?

- Si vous vous rendez compte de l'oubli dans les heures qui suivent l'heure de prise habituelle, prenez la dose et **ne décalez pas** l'heure de la prochaine prise.
- Si l'oubli est supérieur à heures, sautez la prise et prenez la suivante à l'heure habituelle.
(6h si 2 prises /j, 12h si 1 prise /j)
- **Ne doublez pas** la dose pour compenser l'oubli.

QUELS SONT LES PRECAUTIONS A PRENDRE VIS-A-VIS DES AUTRES MEDICAMENTS ?

PILULE CONTRACEPTIVE, CONTRACEPTION OESTROPROGESTATIVE (IMPLANTS, PATCHS, STERILETS HORMONAUX, ANNEAUX VAGINAUX) :

la rifampicine diminue l'efficacité de ces moyens de contraception : utiliser une autre méthode contraceptive (préservatifs +++) pendant le traitement et le mois suivant l'arrêt

ANTICOAGULANTS DE TYPE AVK (Coumadine[®], Previscan[®], Sintrom[®]) :

la rifampicine diminue l'efficacité de ce traitement. Des contrôles de l'INR (prise de sang) plus fréquents doivent être réalisés afin d'adapter la posologie.

VOTRE POSOLOGIE :

- comprimé(s) à mg
- fois par jour
1h avant ou 2h après le repas
 matin midi soir
- Date de fin :

INFORMATIONS PRATIQUES

- **CONSERVATION :**
 - Conservez le médicament dans un endroit sec, à température ambiante (<25°C)
 - Evitez les endroits humides tels que la salle de bain
 - Conservez hors de la vue et de la portée des enfants
- **ALCOOL :**
 - Il est **très fortement déconseillé** de consommer des boissons alcoolisées pendant votre traitement

QUELS SONT LES PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES ?

- **DIARRHEES :**
Effet normal qui disparaîtra à l'arrêt du traitement
- **COLORATION BRUNE ORANGEE** de la salive, des larmes, des urines et des selles se produit systématiquement.
Il est **déconseillé de porter des lentilles** de contact souples durant le traitement car elles seront tachées de façon permanente.

EFFET NORMAL
qui disparaîtra à l'arrêt du traitement
CONTINUEZ LE MEDICAMENT



- **DIARRHEES** persistantes et importantes
- **SAIGNEMENTS inexpliqués**
- **DEMANGEAISONS** généralisées
- **AUTRES**
Nausées, vomissements, fatigue, perte d'appétit

CONTACTEZ VOTRE MEDECIN.



CONTINUEZ LE MEDICAMENT

- **REACTIONS IMPORTANTES**
Rash, fièvre, cloques, rougeur des yeux, maux généraux, douleurs musculaires et articulaires
- **REACTIONS ALLERGIQUES**
type œdème de Quincke

⚠ URGENT ⚠

CESSEZ DE PRENDRE CE MEDICAMENT

CONTACTEZ VOTRE MEDECIN

RIFAMPICINE

RIMACTAN[®] 300MG - RIFADINE[®] 300MG - RIFADINE[®] 2% susp buvable

Ce médicament est un **antibiotique**

Ne pas interrompre un traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis médical

QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI ?

- Si vous vous rendez compte de l'oubli dans les heures qui suivent l'heure de prise habituelle, prenez la dose et **ne décalez pas** l'heure de la prochaine prise.
- Si l'oubli est **supérieur** à heures, sautez la prise et prenez la suivante à l'heure habituelle.
(6h si 2 prises /j, 12h si 1 prise /j)
- **Ne doublez pas** la dose pour compenser l'oubli.

QUELS SONT LES PRECAUTIONS A PRENDRE VIS-A-VIS DES AUTRES MEDICAMENTS ?

PILULE CONTRACEPTIVE, CONTRACEPTION OESTROPROGESTATIVE (IMPLANTS, PATCHS, STERILETS HORMONAUX, ANNEAUX VAGINAUX) :

la rifampicine diminue l'efficacité de ces moyens de contraception : utiliser une autre méthode contraceptive (préservatifs +++) pendant le traitement et le mois suivant l'arrêt

ANTICOAGULANTS DE TYPE AVK (Coumadine[®], Previscan[®], Sintrom[®]) :

la rifampicine diminue l'efficacité de ce traitement. Des contrôles de l'INR (prise de sang) plus fréquents doivent être réalisés afin d'adapter la posologie.

VOTRE POSOLOGIE :

- comprimé(s) à mg
- fois par jour
1h avant ou 2h après le repas
 matin midi soir
- Date de fin :

INFORMATIONS PRATIQUES

- **CONSERVATION :**
 - Conservez le médicament dans un endroit **sec**, à température ambiante (<25°C)
 - Evitez les endroits humides tels que la salle de bain
 - Conservez hors de la vue et de la portée des enfants
- **ALCOOL :**
 - Il est **très fortement déconseillé** de consommer des boissons alcoolisées pendant votre traitement

QUELS SONT LES PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES ?

- **DIARRHEES :**
Effet normal qui disparaîtra à l'arrêt du traitement
- **COLORATION BRUNE ORANGEE** de la salive, des larmes, des urines et des selles se produit systématiquement.
Il est **déconseillé de porter des lentilles** de contact souples durant le traitement car elles seront tachées de façon permanente.

EFFET NORMAL qui disparaîtra à l'arrêt du traitement
CONTINUEZ LE MEDICAMENT



- **DIARRHEES** persistantes et importantes
- **SAIGNEMENTS** inexpliqués
- **DEMANGEAISONS** généralisées
- **AUTRES**
Nausées, vomissements, fatigue, perte d'appétit

CONTACTEZ VOTRE MEDECIN.



CONTINUEZ LE MEDICAMENT

- **REACTIONS IMPORTANTES**
Rash, fièvre, cloques, rougeur des yeux, maux généraux, douleurs musculaires et articulaires
- **REACTIONS ALLERGIQUES**
type œdème de Quincke

URGENT

CESSEZ DE PRENDRE CE MEDICAMENT

CONTACTEZ VOTRE MEDECIN

RIFAMPICINE

RIMACTAN[®] 300MG - RIFADINE[®] 300MG - RIFADINE[®] 2% susp buvable

Ce médicament est un **antibiotique**

Ne pas interrompre un traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis médical

QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI ?

- Si vous vous rendez compte de l'oubli dans les heures qui suivent l'heure de prise habituelle, prenez la dose et **ne décalez pas** l'heure de la prochaine prise.
- Si l'oubli est supérieur à heures, sautez la prise et prenez la suivante à l'heure habituelle.
(6h si 2 prises /j, 12h si 1 prise /j)
- **Ne doublez pas** la dose pour compenser l'oubli.

QUELS SONT LES PRECAUTIONS A PRENDRE VIS-A-VIS DES AUTRES MEDICAMENTS ?

PILULE CONTRACEPTIVE, CONTRACEPTION OESTROPROGESTATIVE (IMPLANTS, PATCHS, STERILETS HORMONAUX, ANNEAUX VAGINAUX) :

la rifampicine diminue l'efficacité de ces moyens de contraception : utiliser une autre méthode contraceptive (préservatifs +++) pendant le traitement et le mois suivant l'arrêt

ANTICOAGULANTS DE TYPE AVK (Coumadine[®], Previscan[®], Sintrom[®]) :

la rifampicine diminue l'efficacité de ce traitement. Des contrôles de l'INR (prise de sang) plus fréquents doivent être réalisés afin d'adapter la posologie.

VOTRE POSOLOGIE :

- comprimé(s) à mg
- fois par jour
1h avant ou 2h après le repas
 matin midi soir
- Date de fin :

INFORMATIONS PRATIQUES

- **CONSERVATION :**
 - Conservez le médicament dans un **endroit sec**, à température ambiante (<25°C)
 - Evitez les endroits humides tels que la salle de bain
 - Conservez hors de la vue et de la portée des enfants
- **ALCOOL :**
 - Il est **très fortement déconseillé** de consommer des boissons alcoolisées pendant votre traitement

QUELS SONT LES PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES ?

- **DIARRHEES :**
Effet normal qui disparaîtra à l'arrêt du traitement
- **COLORATION BRUNE ORANGEE** de la salive, des larmes, des urines et des selles se produit systématiquement.
Il est **déconseillé de porter des lentilles** de contact souples durant le traitement car elles seront tachées de façon permanente.

EFFET NORMAL qui disparaîtra à l'arrêt du traitement
CONTINUEZ LE MEDICAMENT



- **DIARRHEES** persistantes et importantes
- **SAIGNEMENTS inexpliqués**
- **DEMANGEAISONS** généralisées
- **AUTRES**
Nausées, vomissements, fatigue, perte d'appétit

CONTACTEZ VOTRE MEDECIN.



CONTINUEZ LE MEDICAMENT

- **REACTIONS IMPORTANTES**
Rash, fièvre, cloques, rougeur des yeux, maux généraux, douleurs musculaires et articulaires
- **REACTIONS ALLERGIQUES**
type œdème de Quincke

URGENT

CESSEZ DE PRENDRE CE MEDICAMENT

CONTACTEZ VOTRE MEDECIN

RIFAMPICINE

RIMACTAN[®] 300MG - RIFADINE[®] 300MG - RIFADINE[®] 2% susp buvable

Ce médicament est un **antibiotique**

Ne pas interrompre un traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis médical

QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI ?

- Si vous vous rendez compte de l'oubli dans les heures qui suivent l'heure de prise habituelle, prenez la dose et **ne décalez pas** l'heure de la prochaine prise.
- Si l'oubli est **supérieur** à heures, sautez la prise et prenez la suivante à l'heure habituelle.
(6h si 2 prises /j, 12h si 1 prise /j)
- **Ne doublez pas** la dose pour compenser l'oubli.

QUELS SONT LES PRECAUTIONS A PRENDRE VIS-A-VIS DES AUTRES MEDICAMENTS ?

PILULE CONTRACEPTIVE, CONTRACEPTION OESTROPROGESTATIVE (IMPLANTS, PATCHS, STERILETS HORMONAUX, ANNEAUX VAGINAUX) :

la rifampicine diminue l'efficacité de ces moyens de contraception : utiliser une autre méthode contraceptive (préservatifs +++) pendant le traitement et le mois suivant l'arrêt

ANTICOAGULANTS DE TYPE AVK (Coumadine[®], Previscan[®], Sintrom[®]) :

la rifampicine diminue l'efficacité de ce traitement. Des contrôles de l'INR (prise de sang) plus fréquents doivent être réalisés afin d'adapter la posologie.

VOTRE POSOLOGIE :

- comprimé(s) à mg
- fois par jour
1h avant ou 2h après le repas
 matin midi soir
- Date de fin :

INFORMATIONS PRATIQUES

- **CONSERVATION :**
 - Conservez le médicament dans un **endroit sec**, à température ambiante (<25°C)
 - Evitez les endroits humides tels que la salle de bain
 - Conservez hors de la vue et de la portée des enfants
- **ALCOOL :**
 - Il est **très fortement déconseillé** de consommer des boissons alcoolisées pendant votre traitement

QUELS SONT LES PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES ?

- **DIARRHEES :**
Effet normal qui disparaîtra à l'arrêt du traitement
- **COLORATION BRUNE ORANGEE** de la salive, des larmes, des urines et des selles se produit systématiquement.
Il est **déconseillé de porter des lentilles** de contact souples durant le traitement car elles seront tachées de façon permanente.

EFFET NORMAL
qui disparaîtra à l'arrêt du traitement
CONTINUEZ LE MEDICAMENT



- **DIARRHEES** persistantes et importantes
- **SAIGNEMENTS inexpliqués**
- **DEMANGEAISONS généralisées**
- **AUTRES**
Nausées, vomissements, fatigue, perte d'appétit

CONTACTEZ VOTRE MEDECIN.



CONTINUEZ LE MEDICAMENT

- **REACTIONS IMPORTANTES**
Rash, fièvre, cloques, rougeur des yeux, maux généraux, douleurs musculaires et articulaires
- **REACTIONS ALLERGIQUES**
type œdème de Quincke

URGENT

CESSEZ DE PRENDRE CE MEDICAMENT

CONTACTEZ VOTRE MEDECIN

RIFAMPICINE

RIMACTAN[®] 300MG - RIFADINE[®] 300MG - RIFADINE[®] 2% susp buvable

Ce médicament est un **antibiotique**

Ne pas interrompre un traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis médical

QUE FAIRE EN CAS D'OUBLI ?

- Si vous vous rendez compte de l'oubli dans les heures qui suivent l'heure de prise habituelle, prenez la dose et **ne décalez pas** l'heure de la prochaine prise.
- Si l'oubli est supérieur à heures, sautez la prise et prenez la suivante à l'heure habituelle.
(6h si 2 prises /j, 12h si 1 prise /j)
- **Ne doublez pas** la dose pour compenser l'oubli.

VOTRE POSOLOGIE :

- comprimé(s) à mg
- fois par jour
1h avant ou 2h après le repas
 matin midi soir
- Date de fin :

INFORMATIONS PRATIQUES

- **CONSERVATION :**
 - Conservez le médicament dans un endroit **sec**, à température ambiante (<25°C)
 - Evitez les endroits humides tels que la salle de bain
 - Conservez hors de la vue et de la portée des enfants
- **ALCOOL:**
 - Il est **très fortement déconseillé** de consommer des boissons alcoolisées pendant votre traitement

QUELS SONT LES PRECAUTIONS A PRENDRE VIS-A-VIS DES AUTRES MEDICAMENTS ?

PILULE CONTRACEPTIVE, CONTRACEPTION OESTROPROGESTATIVE (IMPLANTS, PATCHS, STERILETS HORMONAUX, ANNEAUX VAGINAUX) :

la rifampicine diminue l'efficacité de ces moyens de contraception : utiliser une autre méthode contraceptive (préservatifs +++) pendant le traitement et le mois suivant l'arrêt

ANTICOAGULANTS DE TYPE AVK (Coumadine[®], Previscan[®], Sintrom[®]) :

la rifampicine diminue l'efficacité de ce traitement. Des contrôles de l'INR (prise de sang) plus fréquents doivent être réalisés afin d'adapter la posologie.

QUELS SONT LES PRINCIPAUX EFFETS INDESIRABLES ?

- **DIARRHEES :**
Effet normal qui disparaîtra à l'arrêt du traitement
- **COLORATION BRUNE ORANGEE** de la salive, des larmes, des urines et des selles se produit systématiquement.
Il est **déconseillé de porter des lentilles** de contact souples durant le traitement car elles seront tachées de façon permanente.

EFFET NORMAL qui disparaîtra à l'arrêt du traitement
CONTINUEZ LE MEDICAMENT



- **DIARRHEES** persistantes et importantes
- **SAIGNEMENTS inexpliqués**
- **DEMANGEAISONS** généralisées
- **AUTRES**
Nausées, vomissements, fatigue, perte d'appétit

CONTACTEZ VOTRE MEDECIN.



CONTINUEZ LE MEDICAMENT

- **REACTIONS IMPORTANTES**
Rash, fièvre, cloques, rougeur des yeux, maux généraux, douleurs musculaires et articulaires
- **REACTIONS ALLERGIQUES**
type œdème de Quincke

⚠ **URGENT** ⚠

CESSEZ DE PRENDRE CE MEDICAMENT

CONTACTEZ VOTRE MEDECIN

Après la RCP

- Ajout d'une note dans la fiche RCP IOA du patient

SCHEIDEN PIERRE...	
Ordonnance struc...16/12/2022 13:5...	KANLAGNA Anoujat
Ordonnance struc...16/12/2022 09:2...	KANLAGNA Anoujat
REEEDUCATION - ...12/12/2022 15:2...	
PEC Kiné	SANCHEZ Laura; B...
Ortho et Traumat...09/12/2022 11:5...	
RCP IOA	KANLAGNA Anouj...
Braçs Chir.Plastiq...09/12/2022 16:1...	
Note de suivi	KANLAGNA Anoujat
Bloc - FEUILLE EC... 08/12/2022 14:5...	
CHECKLIST_HAS	Contributor_syste...

22/12/22 10:34, Dr TROUSSIER Barbara, (PHARMACIEN CLINICIEN)
Entretien patient réalisé avec remise des fiches antibiotiques

- Préparer la sortie du patient → lien ville-hôpital
 - Information du pharmacien d'officine
 - Gestion des ruptures/tensions d'approvisionnement

Merci pour votre attention