

MODE D'EMPLOI

Ces médicaments sont des **antibiotiques** de la famille des **Pénicillines** utilisés dans le traitement de votre infection.



Il est important de se conformer à la prescription médicale.

Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.



La posologie et la durée de l'antibiothérapie doivent être respectées même si l'infection semble avoir cessé. **En effet, dans le cas contraire l'infection peut réapparaître.**

Comment prendre votre médicament ? A prendre pendant ou entre les repas, et à heure régulière.



Comprimés dispersibles :

A avaler directement avec un verre d'eau, ou disperser dans un demi-verre d'eau avant ingestion.



Gélules :

A avaler sans les ouvrir, avec un verre d'eau.



Sachet-dose :

Disperser le contenu du sachet dans un demi-verre d'eau.



Suspension buvable en flacon : Bien agiter le flacon avant chaque utilisation.

Se rapporter à la notice d'utilisation pour les modalités d'administration. L'utilisation de la cuillère-mesure est indispensable pour prélever une quantité précise.

PRECAUTION D'EMPLOI

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez eu une **réaction allergique à un type de Pénicilline.**

| EFFETS INDESIRABLES | PREVENTION | CONDUITE A TENIR |
|-----------------------------|--|--|
| Diarrhées et nausées | Prenez votre traitement au moment des repas. Favorisez une alimentation variée, en équilibrant la nourriture suivant les symptômes : - si constipation, favoriser les fibres des fruits/légumes, - si diarrhées, favoriser les féculents | Consultez votre pharmacien avant toute automédication. En cas de diarrhées importantes et continues sur plusieurs jours avec fièvre, cela peut être le signe d'une pseudo colite membraneuse. Une consultation chez votre médecin est nécessaire. En cas de de diarrhée avec fièvre, ne prenez pas de ralentisseurs de transit (ex lopéramide) |
| Réactions cutanées | Contrôlez régulièrement votre peau, ainsi que les zones de plis | Arrêt du traitement et contre-indication ultérieure d'administration contactez votre médecin. |

QUELQUES CONSEILS



Ne pas interrompre votre traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis médical.

En cas d'oubli d'une prise, attendre la prise suivante sans doubler la dose.



En cas de difficulté, n'hésitez pas à contacter votre médecin ou votre pharmacien !