

MODE D'EMPLOI



La ceftriaxone est un antibiotique de la famille des céphalosporines (c'est une beta lactamine). Il est utilisé pour lutter contre votre infection bactérienne.

Il est important de se conformer à la prescription médicale. Le bon suivi de l'ordonnance (posologie, durée de traitement) est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.

Comment prendre votre médicament ?



L'administration du médicament se fait par voie intramusculaire, sous cutanée ou intraveineuse et nécessite un infirmier. N'oubliez pas de contacter un cabinet d'infirmiers à la sortie de l'hôpital.

PRECAUTION D'EMPLOI

NE PRENEZ PAS ce médicament en cas d'antécédent de réaction allergique aux céphalosporines ou aux pénicillines (type amoxicilline). Informez-en votre médecin pour le changement de votre traitement.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Diarrhées	Favorisez une alimentation variée, en équilibrant la nourriture suivant les symptômes (en cas de constipation : favoriser les fibres des fruits/légumes, en cas de diarrhées : favoriser les féculents).	Consultez votre pharmacien avant toute automédication. En cas de diarrhées importantes et continues sur plusieurs jours avec fièvre, cela peut être le signe d'une pseudo colite membraneuse. Une consultation chez votre médecin est nécessaire. En cas de diarrhée avec fièvre, ne prenez pas de ralentisseurs de transit (ex loperamide)
Eruptions cutanées		Il peut s'agir d'une réaction allergique, consultez votre médecin.
Saignement de nez Sang dans les selles ou les urines		Consultez votre médecin.

QUELQUES CONSEILS



Ne pas interrompre votre traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis médical. Consultez votre pharmacien avant toute prise de médicaments en automédication.

Prévenez votre médecin de tout effet indésirable ou anormal survenant pendant la durée du traitement.

En cas de difficulté, n'hésitez pas à contacter votre médecin ou votre pharmacien !