

Vous allez prendre un traitement par

**CLINDAMYCINE®
DALACINE®**



Date d'application : 01/04/2012 Version : 1

MODE D'EMPLOI

Ces médicaments sont des **antibiotiques** de la famille des **Lincosanides** utilisés dans le traitement de votre infection.

Il est important de se conformer à la prescription médicale.

Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.



La posologie et la durée de l'antibiothérapie doivent être respectées même si l'infection semble avoir cessé. **En effet, dans le cas contraire l'infection peut réapparaître.**

Comment prendre votre médicament ?



A prendre par voie orale avec un verre d'eau, **au cours d'un repas, et à heure régulière.**

Ne pas ouvrir les gélules.

PRECAUTION D'EMPLOI

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez eu une **réaction allergique à un type de Lincosanide.**

INTERACTIONS

Certains autres médicaments ne doivent pas être pris en même temps que ce médicament car ils peuvent modifier l'efficacité de votre traitement :

		CONDUITE A TENIR
Ralentisseur du transit	Imodium®, Arestal®	Ils peuvent diminuer l'absorption de votre médicament. Prenez ces anti-diarrhéiques 2 heures avant ou 3 à 4 heures après votre traitement antibiotique.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Diarrhées	Prenez votre traitement aux repas ou avec une collation.	En cas de diarrhée importante et persistante, accompagnée de douleurs abdominales et de fièvre, contactez votre médecin , cela peut être le signe d'une colite pseudo-membraneuse.
Démangeaisons généralisées avec troubles respiratoires ou chute de tension.		Il peut s'agir d'une manifestation allergique, contactez votre médecin.

QUELQUES CONSEILS



Ne pas interrompre votre traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis médical.
cas d'oubli d'une prise, attendre la prise suivante sans doubler la dose.

En cas de difficulté, n'hésitez pas à contacter votre médecin ou votre pharmacien !