

MODE D'EMPLOI

Ces médicaments sont des **antibiotiques** de la famille des **Fluoroquinolones** utilisés dans le traitement de votre infection.



Il est important de se conformer à la prescription médicale.

Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.



La posologie et la durée de l'antibiothérapie doivent être respectées même si l'infection semble avoir cessé. **En effet, dans le cas contraire l'infection peut réapparaître.**

Comment prendre votre médicament ? A prendre de préférence à jeun, et à heure régulière.



Comprimés :

A prendre par voie orale avec un **verre d'eau**.

Les comprimés **ne doivent pas être écrasés, coupés ou croqués** car cela diminuerait leur efficacité.



Suspension buvable de Ciflox® : Bien agiter avant usage

Se reporter à la notice d'utilisation pour les modalités d'administration. L'utilisation de la cuillère-mesure est indispensable pour prélever une quantité précise (**1/2 cuillère-mesure contient 250 mg de Ciflox® et 1 cuillère-mesure contient 500 mg de Ciflox®**).



Ne pas mâcher les granulés présents dans la suspension.

PRECAUTION D'EMPLOI

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez eu une **réaction allergique à un type de quinolone**.

INTERACTIONS

Certains autres médicaments ne doivent pas être pris en même temps que les Fluoroquinolones car ils peuvent modifier l'efficacité de votre traitement :

		CONDUITE A TENIR
Protecteurs gastriques	Maalox®, Phosphalugel®, Rennie®	Évitez ces associations ou prenez votre antibiotique 2 heures avant ou au moins 6 heures après ces médicaments.
Antiulcéreux	Kéal®, Ulcar®	
Suppléments minéraux contenant du calcium, du fer, du zinc, du magnésium ou de l'aluminium	Fumafer®, Tardyféron®	

Évitez de prendre ce médicament avec du **lait** ou des **produits laitiers** car cela peut diminuer l'efficacité de votre traitement. Il est donc préférable d'**espacer les administrations de 2 à 4 heures**.

Il est possible que la prise de ces médicaments provoque l'apparition de nausées ou de palpitations avec la prise de boissons contenant de la caféine (**café, thé...**). Dans ce cas il est nécessaire de diminuer la consommation de ce type de boissons pendant la durée de traitement.




Vous allez prendre un traitement par

CIPROFLOXACINE[®] ou **LEVOFLOXACINE[®]** ou **OFLOXACINE[®]**
CIFLOX[®] **TAVANIC[®]** **OFLOCET[®]**

Service émetteur : COMEDIMS - Infectiologie

Date d'application : 01/04/2012

Version : 1

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Tendinites	Evitez de pratiquer des sports de haut niveau pendant la durée du traitement.	Contactez votre médecin en cas de douleurs importantes des tendons notamment au niveau des pieds
Photosensibilisation (majoration des coups de soleil) 	Eviter l'exposition au soleil et aux rayons UV pendant la durée de traitement. Utilisez une protection efficace en cas d'exposition au soleil.	Consultez votre pharmacien qui vous indiquera la conduite à tenir. Application d'une pommade adaptée en cas de brûlure du premier degré ou consultation médicale en cas de réaction cutanée sévère.
Diarrhées	Prenez votre traitement aux repas ou avec une collation.	En cas de diarrhée importante et persistante, accompagnée de douleurs abdominales et de fièvre, contactez votre médecin , cela peut être le signe d'une colite pseudo-membraneuse.
Démangeaisons généralisées avec troubles respiratoires ou chute de tension.		Il peut s'agir d'une manifestation allergique, contactez votre médecin .

QUELQUES CONSEILS

 **Ne pas interrompre votre traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis médical.**
En cas d'oubli d'une prise, attendre la prise suivante sans doubler la dose.



En cas de difficulté, n'hésitez pas à contacter votre médecin ou votre pharmacien !