

Vous allez prendre un traitement par

ACIDE FUSIDIQUE® FUCIDINE®



Date d'application : 01/04/2012 - Version 1

MODE D'EMPLOI

Ces médicaments sont des **antibiotiques** de la famille des **Fusidanines** utilisés dans le traitement de votre infection.



Il est important de se conformer à la prescription médicale.

Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.



La posologie et la durée de l'antibiothérapie doivent être respectées même si l'infection semble avoir cessé.
En effet, dans le cas contraire l'infection peut réapparaître.

Comment prendre votre médicament ? A prendre de préférence **en début de repas et à heure régulière.**



Comprimés :

A prendre par voie orale avec un verre d'eau.



Suspension buvable : Bien agiter le flacon avant chaque utilisation.

Se reporter à la notice d'utilisation pour les modalités d'administration. L'utilisation de la cuillère-mesure est indispensable pour prélever une quantité précise.

PRECAUTION D'EMPLOI

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez eu une **réaction allergique à l'acide fusidique.**

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Diarrhées	Prenez votre médicament en position debout ou assise, avec un verre d'eau, au milieu d'un repas	Si la diarrhée persiste pendant plusieurs jours, contactez votre médecin.
Démangeaisons généralisées avec troubles respiratoires ou chute de tension.		Il peut s'agir d'une manifestation allergique, contactez votre médecin.
Hépatite (nausées, vomissements, perte d'appétit, fatigue, jaunisse, urine foncée, selles pâles)		Contactez votre médecin

QUELQUES CONSEILS



Ne pas interrompre votre traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis médical.
En cas d'oubli d'une prise, attendre la prise suivante sans doubler la dose.

En cas de difficulté, n'hésitez pas à contacter votre médecin ou votre pharmacien !