

MODE D'EMPLOI



La teicoplanine est un antibiotique de la famille des Glycopeptides, destinée à lutter contre votre infection bactérienne.

Comment prendre votre médicament ?



La teicoplanine est administrée par voie intraveineuse ou intramusculaire. Les durées d'administration des perfusions intraveineuses sont variables : environ 4 minutes ou 30 minutes selon le schéma choisi

Prenez contact avec un cabinet infirmier de villes ou un prestataire de soins à la sortie d'hôpital.

PRECAUTION D'EMPLOI

NE PRENEZ PAS ce médicament en cas d'antécédents d'allergie à un autre antibiotique de la famille des glycopeptides. En cas d'effets indésirables au moment de l'injection, consultez immédiatement le médecin pour revoir le traitement.

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Diarrhées, vomissements, nausées	Favorisez une alimentation variée, en équilibrant la nourriture suivant les symptômes (en cas de constipation : favoriser les fibres des fruits/légumes, en cas de diarrhées : favoriser les féculents).	Consultez votre pharmacien avant toute automédication. En cas de diarrhées importantes et continues sur plusieurs jours avec fièvre, cela peut être le signe d'une pseudo colite membraneuse. Une consultation chez votre médecin est nécessaire. En cas de diarrhée avec fièvre, ne prenez pas de ralentisseurs de transit (ex loperamide)
Douleur, Fièvre	Repos	Paracétamol 500 mg, si besoin à renouveler toutes les 4 heures
Eruptions cutanées		Contactez le médecin

QUELQUES CONSEILS



Ne pas interrompre votre traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis médical.
Consultez votre pharmacien avant toute prise de médicaments en automédication.
Prévenez votre médecin de tout effet indésirable ou anormal survenant pendant la durée du traitement.

En cas de difficulté, n'hésitez pas à contacter votre médecin ou votre pharmacien !