

MODE D'EMPLOI

Ces médicaments sont des **antibiotiques** de la famille des **Pénicillines** utilisés dans le traitement de votre infection.



Il est important de se conformer à la prescription médicale.
Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.



La posologie et la durée de l'antibiothérapie doivent être respectées même si l'infection semble avoir cessé.
En effet, dans le cas contraire l'infection peut réapparaître.

Comment prendre votre médicament ? A prendre pendant ou entre les repas, et à heure régulière.



Comprimés dispersibles :
A avaler directement avec un verre d'eau, ou disperser dans un demi-verre d'eau avant ingestion.



Gélules :
A avaler sans les ouvrir, avec un verre d'eau.



Sachet-dose :
Disperser le contenu du sachet dans un demi-verre d'eau.




Suspension buvable en flacon : Bien agiter le flacon avant chaque utilisation.
Se rapporter à la notice d'utilisation pour les modalités d'administration. L'utilisation de la cuillère-mesure est indispensable pour prélever une quantité précise.

PRECAUTION D'EMPLOI

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez eu une **réaction allergique à un type de Pénicilline.**

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Diarrhées	Prenez votre traitement aux repas ou avec une collation.	En cas de diarrhée importante et persistante, accompagnée de douleurs abdominales et de fièvre, contactez votre médecin , cela peut être le signe d'une colite pseudo-membraneuse.
Infections vaginales		Contactez votre médecin si ces symptômes persistent.
Démangeaisons généralisées avec troubles respiratoires ou chute de tension.		Il peut s'agir d'une manifestation allergique, contactez votre médecin.

QUELQUES CONSEILS

 **Ne pas interrompre votre traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis médical.**
En cas d'oubli d'une prise, attendre la prise suivante sans doubler la dose.



En cas de difficulté, n'hésitez pas à contacter votre médecin ou votre pharmacien !