

**MODE D'EMPLOI**

Ces médicaments sont des **antibiotiques** de la famille des **Rifamycines** utilisés, en association avec d'autres anti-infectieux, dans le traitement de votre infection.



**Il est important de se conformer à la prescription médicale.**  
Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.



La posologie et la durée de l'antibiothérapie doivent être respectées même si l'infection semble avoir cessé.  
**En effet, dans le cas contraire l'infection peut réapparaître.**

**Comment prendre votre médicament ?** A prendre à jeun, au moins  $\frac{1}{2}$  heure avant un repas, et à heure régulière.



**Gélule :** A avaler sans les ouvrir, avec un verre d'eau.



**Suspension buvable :** Bien agiter le flacon avant chaque utilisation.  
L'utilisation de la cuillère-mesure est indispensable pour prélever une quantité précise de médicament. (100 mg/cuillère-mesure)

**PRECAUTION D'EMPLOI**

**NE PRENEZ PAS** ce médicament si vous avez eu une **réaction allergique aux rifamycines.**

**INTERACTIONS**

Certains autres médicaments ne doivent pas être pris en même temps que ce médicament car ils peuvent modifier l'efficacité de votre traitement :

		<b>CONDUITE A TENIR</b>
<b>Contraceptifs oraux</b>	L'efficacité de ce moyen de contraception peut être diminuée pendant le traitement.	Utilisez une autre méthode contraceptive (préservatifs +++).
<b>AVK (Coumadine®, Previscan®, Sintrom®)</b>	Baisse de l'efficacité de votre traitement.	Prévenez votre médecin à l'introduction du traitement antibiotique, et à l'arrêt de celui-ci pour ajuster la posologie de l'AVK puis contrôler l'INR régulièrement jusqu'à stabilisation.

<b>EFFETS INDESIRABLES</b>	<b>PREVENTION</b>	<b>CONDUITE A TENIR</b>
<b>Diarrhées</b>	Prenez votre traitement aux repas ou avec une collation.	Si la diarrhée persiste pendant plusieurs jours, <b>contactez votre médecin.</b>
<b>Coloration en brun orangé des liquides corporels</b> (sueur, salive, larmes, urine, selles)	Ne portez pas de verres de contact durant le traitement.	Cet effet est sans danger et réversible à l'arrêt du traitement.
<b>Anémie</b> (essoufflement, fatigue, perte d'appétit)		<b>Contactez votre médecin.</b>
<b>Diminution du nombre de plaquettes</b> (ecchymoses, saignements inexplicables du nez ou des gencives, présence de sang dans les urines ou les selles...)		<b>Contactez votre médecin.</b>
<b>Hépatite</b> (nausées, vomissements, perte d'appétit, fatigue, jaunisse, urine foncée, selles pâles)		<b>Contactez votre médecin.</b>
<b>Démangeaisons généralisées</b> avec troubles respiratoires ou chute de tension.		Il peut s'agir d'une manifestation allergique, <b>contactez votre médecin.</b>

**QUELQUES CONSEILS**

 **Ne pas interrompre votre traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis médical.**  
**En cas d'oubli d'une prise, attendre la prise suivante sans doubler la dose.**

 **En cas de difficulté, n'hésitez pas à contacter votre médecin ou votre pharmacien !**