

MODE D'EMPLOI

Ces médicaments sont des **antibiotiques** de la famille des **Tétracyclines** utilisés dans le traitement de votre infection.



Il est important de se conformer à la prescription médicale.

Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.



La posologie et la durée de l'antibiothérapie doivent être respectées même si l'infection semble avoir cessé. **En effet, dans le cas contraire l'infection peut réapparaître.**

Comment prendre votre médicament ?



A prendre avec un verre d'eau, **et à heure régulière**. Il faut éviter de s'allonger pendant une heure après la prise du médicament car il peut être responsable de douleurs oesophagiennes.


PRECAUTION D'EMPLOI

NE PRENEZ PAS ce médicament si vous avez eu une **réaction allergique aux tétracyclines**.

INTERACTIONS

Certains autres médicaments ne doivent pas être pris en même temps que les Tétracyclines car ils peuvent modifier l'efficacité de votre traitement :

		CONDUITE A TENIR
Protecteurs gastriques	Maalox®, Phosphalugel®, Rennie®	Évitez ces associations ou prenez votre antibiotique 2 heures avant ou au moins 6 heures après ces médicaments.
Suppléments minéraux contenant du fer	Fumafer®, Tardyféron®	
Contraceptifs oraux	L'efficacité de ce moyen de contraception peut être diminuée pendant le traitement.	Utilisez une autre méthode contraceptive (préservatifs +++).

EFFETS INDESIRABLES	PREVENTION	CONDUITE A TENIR
Diarrhées, douleurs œsophagiennes	Prenez votre traitement aux repas ou avec une collation.	Si la diarrhée persiste pendant plusieurs jours, contactez votre médecin .
Démangeaisons généralisées avec troubles respiratoires ou chute de tension.		Il peut s'agir d'une manifestation allergique, contactez votre médecin .
Photosensibilisation (majoration des coups de soleil) 	Eviter l'exposition au soleil et aux rayons UV pendant la durée de traitement. Utilisez une protection efficace en cas d'exposition au soleil.	Consultez votre pharmacien qui vous indiquera la conduite à tenir. Application d'une pommade adaptée en cas de brûlure du premier degré ou consultation médicale en cas de réaction cutanée sévère.

QUELQUES CONSEILS



Ne pas interrompre votre traitement ou modifier le rythme d'administration sans avis médical.
En cas d'oubli d'une prise, attendre la prise suivante sans doubler la dose.



En cas de difficulté, n'hésitez pas à contacter votre médecin ou votre pharmacien !