

Enquête dans les 6 laboratoires

Une année (Août 23-Sept 24)

Souches isolées d'infections sur matériel avec antibiogramme

1) Quelles ont les espèces en cause?

Pas de *Staph aureus*

Toutes les souches Staph Linezolide R = *Staphylococcus epidermidis*

Multi resistant : *MetiR*, *Clinda R*, *GentaR*, *Rifam R*, *STX R*

2) Quelles est la proportion de souches de staph R au Linezolid isolées sur matériel en orthopédie ?

	Angers	Tours	Brest	Rennes	Nantes	Poitiers
Staph	2% (3/110)	4% (5/123)	3.9 % (5/130)	4.4% (2/45)	3.7% (4/107)	8.1% (8/148)
S. epi	8.3% (3/36)	9.8% (5/51)	13.5% (5/37)	16.7% (2/12)	18.2% (4/22)	22.8% (8/35)

Est-ce que c'est différent sur matériel ou sans matériel ?

Staph
S. epi
→ Même tendance

Tous les prélèvements ortho
Poitiers
6.8%
23.5%

3) Exposition antérieure au linézolide ?

27 patients : 21 exposés

5 Non renseignés (mais multi-opérés)

1 non exposé

Combien de temps ?

de 4 à 42 Jours

Moyenne de 13 Jours

Dans quelle indication?

Tous pour chirurgie orthopédique : traitement probabiliste ou curatif